



RASSEN BULLETIN TRITICALE 2009

In dit rassenbulletin staan de opbrengsten en eigenschappen weergegeven van triticale rassen. Het rassenonderzoek heeft in 2008 plaatsgevonden op 3 locaties op zand- en dalgrond, verspreid over Nederland. In de tabel zijn de eigenschappen en de opbrengsten, met en zonder ziektenbestrijding, (gemiddeld over de jaren 2003 t/m 2008), weergegeven.

Overzicht van de rasseneigenschappen en korrelopbrengst bij triticale (gemiddeld over de jaren 2003 t/m 2008)

Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap. Vroege afrijping wordt door een hoog cijfer aangeduidt.

	Lengte van het stro ¹⁾	Stevigheid van het stro ³⁾	Vroegheid in de aar komen	Vroegrijpheid	Resistentie tegen:			Korrelopbrengst	
					Meeldauw	Bruine roest	Bladvlekkenziekte	Zandgrond	Dalgrond
²⁾ Rassenlijstrassen									
A Dinaro	88	8,5	5	7,5	8,5	8,5	7	105	105
A Matinal	113	8	6,5	6,5	8,5	8,5	7,5	92	89
A SW Talentro	93	8,5	7	8	8	7,5	7	103	101
A Triamant	106	8	8	8	8	8	7	100	105
N Trizeps	108	8	7,5	8,5	9	8,5	7	116	117
100 = ...cm; ton/ha	115							7,2	8,0

- 1) Lengte van het stro en korrelopbrengsten zijn weergegeven in verhoudingsgetallen. Hoge waarderingscijfers betekenen goede stevigheid van het stro, vroeg in de aar komen, vroeg rijp en goede resistenties.
- 2) Rubricering in de Rassenlijst 2009: A = Algemeen aanbevolen ras, B = Beperkt aanbevolen ras, N = Nieuw aanbevolen.
- 3) Cijfers zijn ongewijzigd t.o.v. rassenlijst 2008, omdat geen nieuwe waarnemingen zijn toegevoegd.

©SPNA, november 2008, R.A.J Velema en W.S. Veldman
 SPNA stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruikmaking van de gegevens