



RASSEN BULLETIN

ZOMERTARWE 2007

In dit rassenbulletin staan de opbrengsten en eigenschappen weergegeven van zomertarwe rassen. Het rassenonderzoek heeft in 2006 plaatsgevonden op 4 locaties op klei- en zandgrond, verspreid over Nederland. In de tabel zijn de eigenschappen en de opbrengsten, met en zonder ziektenbestrijding, (gemiddeld over de jaren 2001 t/m 2006), weergegeven. Er was in 2006 1 nieuw 1^e jaarsras in onderzoek.

Overzicht van de rasseneigenschappen en korrelopbrengst bij zomertarwe (gemiddeld over de jaren 2001 t/m 2006)

Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap. Vroege afrijping wordt door een hoog cijfer aangeduid. In het gele vlak staan de cijfers van de rassen die op de rassenlijst van 2006 nog niet voorkwamen.

	lengte stro (rel)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen:						Opbrengst klei (rel)		Opbrengst zand (rel)			
					Schot ¹⁾	Bruine Roest ¹⁾	Gele roest ¹⁾	Meeldauw	Bladvlekkenziekte ¹⁾	Zwartschimmels ¹⁾	met ziektenbestrijding	zonder ziektenbestrijding	met ziektenbestrijding	zonder ziektenbestrijding		
Rassenlijststrassen																
A	Baldus	91	8,0	8,5	8,0	8,0	7,0	6,5	6,0	6,5	6,5	94	91	96	95	
A	Pasteur	98	7,5	8,0	6,5	6,5	9,0	„	8,0	7,5	6,0	94	95	97	102	
A	Tybalt	93	8,0	6,5	7,0	8,5	8,5	„	8,5	6,5	6,5	106	104	106	105	
N	Quattro	108	8,0	6,5	6,5	6,0	8,5	„	8,0	7,0	8,5	99	100	95	98	
N	Zirrus	98	8,0	8,0	6,0	8,0	8,5	„	8,0	7,5	6,5	102	107	104	105	
B	Lavett	107	7,0	7,5	7,5	8,5	7,0	7,0	8,5	6,0	7,0	97	96	91	90	
Nieuw in rassenlijst 2007																
N	Trappe	101	8,0	6,5	6,5	7,5	7,0	„	7,5	7,5	7,0	108	110	102	94	
		100=..cm	95							100=.. Ton/ha	8,7	8,2	7,5	6,8		

¹⁾ Rassenlijstcijfers zijn ongewijzigd t.o.v. rassenlijst 2006, omdat er geen nieuwe waarnemingen toegevoegd zijn.

„ Geen gegevens beschikbaar