



# RASSENULLETIN ZOMERTARWE 2010

Dit rassenbulletin geeft een overzicht van de opbrengsten en eigenschappen van zomertarwerassen. In 2009 zijn de rassen onderzocht op vier locaties in Nederland voor opname op de Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouwgewassen. Van de vier locaties lagen er drie op kleigrond en één op zandgrond. Op alle locaties is zowel een proef zonder ziektebestrijding als een proef met ziektebestrijding uitgevoerd. De proeven lagen bij proefboerderijen en bij kweekbedrijven. In de onderstaande tabel zijn de gemiddelde waarden voor de eigenschappen en de korrelopbrengst weergegeven over de laatste zes jaar.

Overzicht eigenschappen\* en korrelopbrengsten van zomertarwerassen (gem. 2004 t/m 2009)

	rubricering <sup>1</sup>	lengte stro (rel.)	stevigheid	vroegheid aar	vroegrijpheid	resistentie tegen				opbrengst klei (rel.)		opbrengst zand (rel.)	
						bladvekkenziekte	meeldauw <sup>2</sup>	bruine roest	schot	met ziektebestr.	zonder ziektebestr.	met ziektebestr.	zonder ziektebestr.
Trappe	A	106	8	7	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	102	102	97	93
Tyalt	A	98	8	6,5	6,5	7	8,5	8,5	8,5	101	101	99	100
Zirrus	A	102	8	8	6,5	7,5	8	8	7,5	99	99	101	100
Baldus	B	95	8	8,5	8	6,5	6	7	8	86	82	95	92
Pasteur	B	103	7,5	7,5	6,5	7,5	8	9	7	86	86	89	99
Quattro	B	112	8	6,5	6,5	7	8	8,5	6	97	95	89	97
100 = ... cm; ton/ha		91								8,4	7,9	8,1	7,4

\* een hoger cijfer duidt op een gunstige waardering voor de betreffende eigenschap  
(goede stevigheid van het stro, vroeg in aar komen, vroeg rijp en goede resistenties)

<sup>1</sup> rubricering conform de Aanbevelende Rassenlijst 2010 (A= Algemeen aanbevolen ras; B= Beperkt aanbevolen ras)

<sup>2</sup> geen nieuwe waarnemingen in 2009: cijfers ongewijzigd

Bron tabel: Persbericht 16-11-2009 van de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR).