

# Rassenbulletin bladrammenas en gele mosterd (stoppelgewassen) 2010

Auteur: Johan Wander

Datum: april 2010

Financiering CGO groenbemesters: Productschap Akkerbouw en Plantum NL / zaadhuizen.

Uitvoerende organisatie: team onderzoek DLV Plant (sinds 2006)

Bladrammenas en gele mosterd worden veel gebruikt als groenbemester op akkerbouwbedrijven waar suikerbieten een belangrijke plaats in het bouwplan innemen. De gewassen leveren een bijdrage aan het organische stofgehalte en leggen stikstof vast voor het volggewas. Bij de keuze tussen bladrammenas en gele mosterd is vooral de mogelijke zaaitijd van belang; gele mosterd kan later in het seizoen gezaaid worden dan bladrammenas.

Bij de keuze van een ras is de snelheid van grondbedekking een belangrijk criterium omdat een ras met een hoge score een betere onkruidonderdrukking geeft. De score voor laatheid bloei is van belang in verband met het onderploegen. Een ras dat later bloeit (hoge score), geeft zodoende minder kans op opslag.



Bij bladrammenas treden er grote verschillen in bloei op tussen de rassen

Bladrammenas en gele mosterd zijn waardplant voor bietencysteeltjes. Rassen kunnen daarom alleen op de rassenlijst geplaatst worden als ze een bepaald resistentieniveau hebben tegen het witte bietencysteeltje. Aan de hand van de resultaten van pottenproeven wordt deze resistentie ingedeeld in de klassen 70 tot 90% reductie (Pf/Pi-waarde 0,1 – 0,3) en meer dan 90% reductie (Pf/Pi < 0,1). Naarmate vanaf augustus later wordt gezaaid, kan vanwege de afnemende bodemtemperatuur weinig bestrijding door lokking verwacht worden. Bij vroege zaai en hoge bodemtemperatuur kan een beperkte bestrijding verkregen worden.

Overzicht raseigenschappen bladrammenas gemiddeld over de jaren 2004 t/m 2009, onderzoek uitgevoerd op kleigrond in Flevoland en in Zeeland.

Ras <sup>1</sup>	Rubri- cering <sup>2</sup>	Resistentie tegen witte bietencyste- aaltje (Pf/Pi- waarde) <sup>3</sup>	Snelheid grondbe- dekking <sup>4</sup>	Laat- heid bloei <sup>4</sup>	Mate van knol- ontwik- keling <sup>4</sup>	Lengte (rel. 100 = 68 cm)	Stevig- heid <sup>4,5</sup>	Resis- tentie tegen Alter- naria <sup>4,6</sup>
Radical	A	0,1 - 0,3	7,5	9	8,5	85	8,5	6,5
Final	A	< 0,1	7	9	9	83	9	6
Arrow	A	0,1 - 0,3	7,5	8,5	7,5	125	-	7,5
Adam	A	0,1 - 0,3	8	7,5	8	119	-	7,5
Brutus	A	0,1 - 0,3	8	7,5	7,5	117	7,5	8
Corporal	A	< 0,1	7,5	8	8	97	8	7,5
Defender	A	0,1 - 0,3	7,5	8	8	111	-	7,5
Adios	A	< 0,1	7	8,5	8	71	9	6
Comet	A	< 0,1	7	8,5	8	112	8	8,5
Doublet	A	< 0,1	7	8,5	7	79	-	7,5
Colonel	A	< 0,1	7,5	7	8,5	117	6	8
Xcellent	N	0,1 - 0,3	8	8,5	8	106	-	8
Guillotine	N	0,1 - 0,3	8	8	8	116	-	7,5
Image	N	< 0,1	7,5	8,5	7,5	106	-	7,5
Reflex	N	< 0,1	7	9	8	91	-	6
Respect	N	< 0,1	7	9	6,5	79	-	6,5
Evergreen	N	0,1 - 0,3	7	9	7,5	86	-	5
Maximus	N	<0,1	8	8,5	7,5	107	-	7,5
Contra	N	<0,1	7,5	9	8	90	-	6,5
Dracula	N	0,1 - 0,3	7	9	8,5	69	-	5,5
Radetzky	N	0,1 - 0,3	7	8,5	8	78	-	7
2 jaar onderzocht								
Reset	2e jrs	<0,1	7,5	9	8	89	-	7

Overzicht raseigenschappen gele mosterd gemiddeld over de jaren 2004 t/m 2009, onderzoek uitgevoerd op kleigrond in Flevoland en in Zeeland.

Ras <sup>1</sup>	Rubricering <sup>2</sup>	Resistentie tegen witte bietencysteaaltje (Pf/Pi-waarde) <sup>3</sup>	Snelheid grondbedekking <sup>4</sup>	Laatheid bloei <sup>4</sup>	Lengte (rel. 100 = 119 cm)	Stevigheid <sup>4</sup>	Resistentie tegen Alternaria <sup>4,6</sup>
Architect	A	0,1 - 0,3	8	8,5	101	7	6,5
Bonapart	A	0,1 - 0,3	8	8,5	96	8	6
Esprit	A	0,1 - 0,3	8	8,5	101	7,5	7
Forum	A	0,1 - 0,3	8	8,5	104	7	7,5
Sirtaki	A	0,1 - 0,3	8	8,5	94	5	5,5
Accent	A	< 0,1	8	8	104	6,5	7,5
Saloon	A	0,1 - 0,3	8	8	99	6,5	7
Abraham	A	0,1 - 0,3	7,5	8,5	97	7	6,5
Carline	A	0,1 - 0,3	7,5	8,5	96	7,5	6
Center	A	0,1 - 0,3	7,5	8,5	103	6,5	7,5
Achat	B	0,1 - 0,3	7,5	8	104	5,5	7
Achilles	B	< 0,1	6,5	8,5	96	8	6
Passion	N	0,1 - 0,3	8,5	8,5	104	6	6,5
2 jaar onderzocht							
Sa07706/WIL	2e jrs	-	8	8	99	6,5	7
Sa07714/TEE	2e jrs	-	7,5	8,5	98	8	6,5

<sup>1</sup> De volgorde van de rassen is gebaseerd op 1) de rubricering, 2) de combinatie van snelheid grondbedekking en laatheid bloei, 3) snelheid grondbedekking, 4) laatheid bloei, 5) BCA-resistentie, 6) rasnaam.

<sup>2</sup> Rubricering in de Rassenlijst: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras.

<sup>3</sup> Pf/Pi-waarde; laag cijfer betekent een hoge mate van resistentie; Pf/Pi-waarde < 0,1 = BCA 1; - = niet bekend.

<sup>4</sup> Een hoog cijfer betekent resp. een vlotte grondbedekking, late bloei, weinig knolvorming, stevig gewas, goed resistent tegen Alternaria. De cijfers van de twee soorten (gele mosterd en bladrammenas) zijn niet onderling vergelijkbaar.

<sup>5</sup> - = onvoldoende gegevens.

<sup>6</sup> Het betreft Alternaria-soorten welke alleen op kruisbloemigen voorkomen. Kans op overdracht van groenbemester op cultuurgewas is alleen aanwezig bij koolgewassen of koolzaad. O.a. bieten, aardappelen, uien en peen lopen geen gevaar, omdat het andere Alternaria-soorten betreft.

Dit bulletin wordt gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de CSAR (Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst).

Copyright: ©2010 Wageningen, DLV Plant. Alle rechten voorbehouden. | [disclaimer](#)