



### MIDDELENTABEL BESTRIJDING SCHIMMELZIEKTEN IN DE UIENTEELT 2014

Verschillende schimmelziekten bedreigen de uienteelt. In Nederland zijn diverse middelen toegelaten in de teelt van uien, elk met zijn specifieke kwaliteiten. Het ene middel is sterker op valse meeldauw, het andere middel weer sterker op bladvlekkenziekte. In dit overzicht vindt u informatie over de werkzaamheid van de gewasbeschermingsmiddelen, uitgesplitst naar verschillende ziektes. Voor het gebruik van de middelen (o.a. max. aantal bespuitingen) dient u vanzelfsprekend het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing te volgen. Deze kunt u eenvoudig vinden door op de verschillende merknamen te klikken of op <http://www.ctgb.nl>.

De tabel is tot stand gekomen op basis van proeven en praktijkervaringen, samengesteld door Cebeco Agrochemie, DLV Plant en PPO-AGV en kan een hulpmiddel zijn voor de telers/adviseurs bij de bepaling van de bestrijdingsstrategie, toegespitst op de eigen situatie.

#### Schimmelziekten in ui:

Overzicht belangrijkste middelen en werkzame stoffen

Werking tegen <sup>1</sup>

Merknaam	Werkzame stoffen	I of kg/ha	Etiket	Valse meeldauw	bladvlekken ziekte	stemphylium	Papiervlek-kenziekte	Koprot	aandroog tijd (uren) <sup>2</sup>	Regen Vastheid <sup>3</sup>
<a href="#">Acrobat DF</a> *	dimethomorph + mancozeb	2,5	max. 4x	+++	+	(+)	++		2-6	++(+)
<a href="#">Allure vloeibaar</a>	prochloraz + chloorthalonil	1,25		(+)	+++			(+)	2-4	++(+)
<a href="#">Amistar</a> *	azoxystrobine	0,8-1,0	max. 4x	+	++(+)	+(+)	++		1-2	+++
<a href="#">Fandango</a> *	fluoxastrobine + prothioconazool	1,0-1,25	max. 4x	+++	++(+)	++(+)	++(+)	+	0,5	+++
<a href="#">Fubol Gold</a>	metalaxyl-m + mancozeb	2,0	max. 3x preventief	+++	+	(+)	+++	-	2-6	+++
<a href="#">Kenbyo FI</a>	kresoxim-methyl	0,4	max. 3x	+	++(+)	+(+)	++		1-2	+++
<a href="#">mancozeb-divers</a>	mancozeb	2,0 - 2,5 <sup>4</sup>	max. 4-5x, interval min. 10-14 dagen <sup>4</sup>	++	+		+		2-6	+(+)
<a href="#">maneb-divers</a>	maneb	2	max. 5x, interval min. 10 dagen <sup>4</sup>	++	+				2-6	+(+)
<a href="#">Olympus</a> *	Chloorthalonil + azoxystrobine	2,5	max. 2 x, interval 28 dagen	+(+)	+++	++	++	+	1-2	++(+)
<a href="#">Rovral</a> * <a href="#">aquaflo</a> e.a.	iprodion	0,5-1,0			+(+)				4-6	++
<a href="#">Shirlan</a> e.a.	fluazinam	0,5		(+)	+++	+	++	(+)	1-2	++(+)
<a href="#">Signum</a>	Pyraclostrobin + boscalid	1,5	max. 2x	+	++(+)	++	+(+)	++	1-2	+++
<a href="#">Valbon</a>	Benthiavalicarb + mancozeb	2	2x blok 3x, (interval tussen blok 30 dagen)	+++	+	(+)	++		2-6	++(+)

1: +++: zeer goede werking, ++: goede werking, +: redelijke werking, (+): halve +

2: Bron: Gewis

3: Gebaseerd op proeven en ervaringen in aardappelen: [www.euroblight.net](http://www.euroblight.net) en Gewis

4: Maximale dosering, interval en toepassingsstadium afhankelijk van het product.

\* driftrestricties; zie etiket