

Rassenbulletin bladrammenas voorjaarszaai 2012

Auteur: Johan Wander

Datum: december 2011

Financiering CGO groenbemesters: Productschap Akkerbouw en Plantum NL / zaadhuizen.

Uitvoerende organisatie: team onderzoek DLV Plant (sinds 2006)

In 2012 worden voor het tweede jaar resultaten gepubliceerd betreffende de resistentie van bladrammenasrassen tegen het maïswortelknobbelaaltje (*Meloidogyne chitwoodi*). Van de 5 nieuw geplaatste rassen hebben 3 deze resistentie. Dit quarantaineorganisme met een groot aantal waardplanten komt steeds vaker voor. Het telen van een resistent ras komt minimaal overeen met zwarte braak. Rassen met deze resistentie hoeven voor opname op de rassenlijst geen resistentie te hebben tegen het witte bietencysteeltje. Aan de hand van de resultaten van pottenproeven wordt de bietencysteeltjesresistentie ingedeeld in de klassen 70 tot 90% reductie (Pf/Pi-waarde 0,1 – 0,3) en meer dan 90% reductie (Pf/Pi < 0,1).

Bladrammenas kan bij inzaai in het voorjaar een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van het organische stofgehalte en kan vooral een goede bestrijding geven van o.a. het witte bietencysteeltje. Naarmate het groeiseizoen langer kan zijn, is de bestijding beter. Om zaadvorming te voorkomen moet er wel één of enkele keren gemaaid worden.

Bij de rassenkeuze is voorts de score voor laatheid bloei van belang. Hoe beter de score, hoe later er gemaaid hoeft te worden. De score voor grondbedekking is van belang in verband met de onkruidonderdrukking en de score voor hergroei is van belang in verband met het herstel van het gewas na het maaien.

Omdat voorjaarszaai van bladrammenas op kleigrond weinig meer gebeurt en omdat vroege zaai van bladrammenas op zandgrond toeneemt, is de onderzoekslocatie verschoven van kleigrond in Flevoland naar zandgrond in Limburg (De Peel).

In het onderzoek worden 200 kiemkrachtige zaden per m² gezaaid in mei. Het maaien gebeurt voor er kiemkrachtige zaden gevormd worden bij de vroegste rassen. Dit is als de vroegste zaden nog groen en waterig zijn. Het kan zinvol zijn om enkele dagen voor het ploegen nogmaals te maaien om te voorkomen dat er een natte moeilijk verteerbare massa onderin de bouwvoor komt.

Toelichting bij de tabel:

¹ De volgorde van de rassen is gebaseerd op 1) de rubricering, 2) BCA-resistentie, 3) Resistentie *M. chitwoodi*, 4) de combinatie van snelheid grondbedekking, laatheid bloei en hergroei, 5) laatheid bloei, 6) snelheid grondbedekking, 7) hergroei, 8) rasnaam.

² Rubricering in de Rassenlijst: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras.

³ Pf/Pi-waarde; laag cijfer betekent een hoge mate van resistentie; Pf/Pi-waarde < 0,1 = BCA 1; - = niet bekend.

⁴ R = resistent tegen het maïswortelknobbelaaltje (*M. chitwoodi*); relatieve vatbaarheid t.o.v. het gemiddelde van de niet resistente rassen Radical en Siletina kleiner dan 6%.

⁵ Een hoog cijfer betekent resp. een vlotte grondbedekking, late bloei, goede hergroei.

Overzicht raseigenschappen bladrammenas voor voorjaarszaai gemiddeld over de jaren 2006 t/m 2011, onderzoek uitgevoerd op kleigrond in Flevoland t/m 2009 en sinds 2009 op zandgrond in Limburg.

Ras ¹	Rubricering ²	Resistentie tegen witte bietencystealtje (Pf/Pi-waarde) ³	Resistentie tegen <i>M. chitwoodi</i> ⁴	Snelheid grondbedekking ⁵	Laatheid bloei ⁵	Hergroei na laat maaien ⁵
Doublet	A	< 0,1	R	7	8,5	7
Maximus	A	< 0,1		7,5	8,5	7
Respect	A	< 0,1		6,5	9	7
Contra	A	< 0,1		7	8,5	7
Ramses	A	< 0,1		7	8,5	7
Corporal	A	< 0,1		7,5	8	7
Final	A	< 0,1		6	8,5	7,5
Consul	A	< 0,1		6,5	8,5	6,5
Image	A	< 0,1		7	8	6
Adios	A	< 0,1		6,5	8	6,5
Reflex	A	< 0,1		6,5	8,5	5,5
Radetzky	A	0,1 - 0,3	R	6,5	8,5	7,5
Dracula	A	0,1 - 0,3	R	6	8,5	8
Terranova	A	0,1 - 0,3	R	7	8	6,5
Anaconda	A	0,1 - 0,3	R	7,5	7,5	6,5
Radical	A	0,1 - 0,3		7,5	8	7
Evergreen	A	0,1 - 0,3		6,5	9	6,5
Guillotine	A	0,1 - 0,3		7,5	8	6,5
Adagio	A	0,1 - 0,3		7	8	7
Defender	A	0,1 - 0,3		7,5	8	6
Adam	A	0,1 - 0,3		7,5	7,5	6,5
Cosmos	N	< 0,1		7,5	8,5	7,5
Melotop	N	0,1 - 0,3	R	7	9	6,5
Valencia	N	0,1 - 0,3	R	7,5	8,5	6
Edwin	N	0,1 - 0,3		7	8,5	6
Carwoodi	N	> 0,3	R	6,5	8,5	5,5
3 jaar onderzocht						
Radar		0,1 - 0,3		7	8,5	6,5
2 jaar onderzocht						
Joo-Rs-09-01				7,5	9	7,5
Joo-Rs-09-02				7	9	7,5
POR 1001				6,5	8,5	7,5
Joo-Rs-09-03				7	8,5	6
VDR 2971021				7	8	6,5
O 501011				8	7,5	6
POR 9302				8	7,5	6
VDR 27000				6,5	8	6,5

Dit bulletin wordt gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de CSAR (Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst).

Copyright: ©2011 Wageningen, DLV Plant. Alle rechten voorbehouden. | [disclaimer](#)