



# Rassenbulletin Cichorei 2007

Dit rassenbulletin geeft de resultaten weer van het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek van cichorei. In 2006 heeft het onderzoek plaatsgevonden op drie locaties in Nederland. Twee proeven lagen op de zuidwestelijke kleigronden, nl. één in Vogelwaarde in Zeeuwsch-Vlaanderen en één in Colijnsplaat op Noord-Beveland. De derde proef lag op de zuidoostelijke zandgronden, nl. in Vredepeel.

De financiële opbrengst is gebaseerd op de rasverschillen in wortelopbrengst en inulinegetal. Eventuele verschillen in grondtarra zijn niet meegenomen. Deze verschillen lijken klein te zijn en konden tot nu toe niet betrouwbaar worden vastgesteld.

## Eigenschappen, opbrengsten en gehalten van cichoreirassen; gemiddelden van 2001 t/m 2006

		Verhoudingsgetallen					
		Vroegheid grondbedekking	Schietresistentie	Wortelopbrengst	Inulinegetal	Inuline-opbrengst	Financiële opbrengst**)
<b>Rassenlijstrassen*)</b>							
A	Belcanto	7,0	7,0	101	100	101	101
A	Melci	7,5	7,5	100	100	101	101
A	Crescendo	7,0	9,0	98	102	100	100
A	Arioso	7,0	9,0	100	100	100	100
B	Arancha	7,0	8,5	101	98	99	99
<b>3 jaar onderzocht</b>							
	Echo	6,5	8,5	95	105	100	99
<b>2 jaar onderzocht</b>							
	Bandoura	6,0	10,0	92	104	96	96
	FD 0503	7,5	8,0	103	100	103	103
100 = ..ton/ha, -, ton/ha, euro/ha				59,3	17,7	10,5	2263

\*) Rubricering in Rassenlijst 2007

\*\*) De financiële opbrengst is berekend op basis van 48.50 euro per ton netto cichorei en 0,30 euro per ton cichorei per 0,1 punt lager of hoger inulinegetal dan 16; er is geen rekening gehouden met grondtarra.

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, november 2006, ir. L. van den Brink.

Het PPO stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruikmaking van de gegevens.