

RASSEN BULLETIN ZOMERGERST 2009

In dit rassenbulletin staan de opbrengsten en eigenschappen weergegeven van zomergerstrassen. Deze rassen zijn in 2007 onderzocht op 6 locaties, verspreid over Nederland. In de tabel zijn de eigenschappen (gemiddeld over de jaren 2005 t/m 2008) en de opbrengsten, zowel met als zonder ziektenbestrijding (gemiddeld over de jaren 2003 t/m 2008), weergegeven.

Overzicht van de opbrengst bij zomergerst (gemiddeld over de jaren 2003 t/m 2008)

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Lengte van het stro				Resistentie tegen:			Korrelopbrengst kleigrond		Korrelopbrengst zand- en dalgrond		Kwaliteitsgegevens			
		Lengte van het stro	Stevigheid van het stro	Vroegheid in de aar komen	Vroegrijpheid	Meeldauw	Netvlekkenziekte ³⁾	Bladvlekkenziekte	Met ziektenbestrijding	Zonder ziektenbestrijding	Met ziektenbestrijding	Zonder ziektenbestrijding	Brouwkwiteit	Aandeel volgerst ³⁾ (met ziektenbestrijding)	Eiwitgehalte ³⁾	Korrelgewicht ³⁾
Brouwergerst																
A	Class	102	7,5	8	7,0	9	6	7	99	98	98	100	7	101	100	101
A	Erlina	98	8	5,5	6,5	9	7,5	8,5	101	99	100	99	7	101	94	100
A	Prestige	102	8	8	7	9	6	6,5	97	99	99	98	8	103	96	102
A	Tipple	95	8	6	6	9	7	7	105	105	101	102	7	100	94	102
B	Arcadia	103	8	7	6,5	8	7	7,5	94	96	101	101	7	101	99	104
B	Kuburas	101	7,5	6,5	6,5	7	7,5	8,5	100	101	97	95	7	100	95	98
N	Kangoo	103	7,5	7	6,5	9	7,5	7	102	102	102	103	7	104	101	104
N	Poet	97	7,5	6	6,5	9	7	7	102	100	101	102	7	96	98	91
Nieuw in Rassenlijst 2008																
N	Acrobat	102	7,5	7,5	7,0	9,0	6,5	7,5	99	99	103	102	7	..	93	99
N	Calico	98	8	7	6,5	9	6,5	7	104	104	104	102	7	..	91	105
N	Quench	98	8	6,5	6,0	9	7	8	101	99	106	104	8	..	93	101
Voergerst																
A	Class	102	7,5	8	7,0	9	6	7	99	98	98	100				
B	Arcadia	103	8	7	6,5	8	7	7,5	94	96	101	101				
Rassen in onderzoek (2 jaar)																
	Conchita	105	7,5	8,0	6,5	9	7,5	7,5	104	99	103	106				
	IN 0616	102	8	7,5	7	9	7,5	7,5	101	103	101	101				
	Imidis	93	8	6,5	6	9	7,5	7,5	103	101	100	99				
	100 =cm; ton/ha; %;gr	74							8,0	7,4	6,9	6,5		95	9,6	48,4

- 1) Raseigenschappen hebben betrekking op de jaren 2005 t/m 2008, korrelopbrengsten op de jaren 2003 t/m 2008. Lengte van het stro, korrelopbrengsten, volgerstaandeel, eiwitgehalte en korrelgewicht zijn weergegeven in verhoudingsgetallen. Hoge waarderingscijfers betekenen goede stevigheid van het stro, vroeg in de aar komen, vroeg rijp en goede resistenties, ... : onvoldoende gegevens beschikbaar.
- 2) Rubricering van de Rassenlijst 2008: A = Algemeen aanbevolen ras, B = Beperkt aanbevolen ras, N = Nieuw aanbevolen ras.
- 3) Rassenlijstcijfers zijn ongewijzigd t.o.v. rassenlijst 2007, omdat er geen nieuwe waarnemingen zijn toegevoegd.