



Rassenbulletin Zomergerst 2014

Dit rassenbulletin geeft een overzicht van de opbrengsten en eigenschappen van zomergerstrassen. In 2013 zijn de rassen onderzocht op zes locaties in Nederland voor opname op de Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouwgewassen. Van de zes locaties lagen er drie op kleigrond en drie op zand- en dalgrond. Op alle locaties is zowel een proef zonder ziektebestrijding als een proef met ziektebestrijding uitgevoerd. De proeven lagen voor een deel bij PPO-proefbedrijven en voor een deel bij kweekbedrijven.

Rassenbulletin Zomergerst 2014

Overzicht eigenschappen* (gem. 2010 t/m 2013) en korrelopbrengsten (gem. 2008 t/m 2013) van zomergerstrassen

	rubricering**	lengte stro (rel.)	stevigheid	vroegheid aar	resistentie tegen				brouwkwaliteit	opbrengst klei (rel.)		opbrengst zand/dal (rel.)	
					vroegrijpheid	meeldauw	netvlekkenziekte	bladvlekkenziekte***		met ziektebestr.	zonder ziektebestr.	met ziektebestr.	zonder ziektebestr.
brouwgerstrassen													
Concerto	A	105	6	7	6	9	7	6	8	101	102	98	99
Quench	A	99	7	6	6	9	7	8	7	99	96	100	98
Tipple	A	94	7.5	6	6.5	7	7	7	7	99	99	96	94
Jennifer	N ₂	98	7.5	8.5	7.5	8.5	7	8.5	7	98	99	98	102
Tesla	N ₂	103	6	6	6.5	9	7	7.5	8	101	102	103	103
Columbus	N ₁	102	6.5	8	7	9	7	8	8	103	103	108	104
Salome	N ₁	96	7	7	7.5	9	7	6	7	100	101	107	105
Shuffle	N ₁	106	7.5	7	6.5	9	7	6.5	8	99	99	101	103
Calico	B	93	8	7.5	7	9	6.5	8	7	96	97	97	98
Prestige	B	97	7.5	8.5	7.5	9	6	7.5	7	90	91	92	91
voegerstrassen													
Shannon	A	102	8	8	7	9	7	7		101	101	103	102
Natasia	N ₂	98	6.5	7	7	7.5	7	8		101	102	103	102
2 jaar onderzocht													
KWS Asta		110	7	7.5	6.5	9	7.5	5		105	103	105	104
Odyssey		102	6.5	6.5	6	9	7	8		103	101	105	103
TATUM		102	7	8	7.5	9	7	8		102	103	102	107
100 = ... cm; ton/ha		83								9.1	8.6	7.4	6.8

* een hoger cijfer duidt op een gunstige waardering voor de betreffende eigenschap (stevig stro, vroeg in aar komen, vroeg rijp, goede resistenties, goede brouwkwaliteit)

** rubricering op de Aanbevelende Rassenlijst 2014 (A= Algemeen aanbevolen ras; B= Beperkt aanbevolen ras; N= Nieuw aanbevolen ras (1e/2e jaar op RL))

*** geen nieuwe waarnemingen voor bladvlekkenziekte in 2013: cijfers van rassenlijst 2013 blijven gehandhaafd

Bron tabellen: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2014 (onderzoek uitgevoerd in opdracht van Plantum NL en Productschap Akkerbouw).

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, november 2013, ing. Ruud Timmer.

PPO stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruikmaking van de gegevens.