



RASSEN BULLETIN ZOMERTARWE 2013

Dit rassenbulletin geeft een overzicht van de opbrengsten en eigenschappen van zomertarwerassen. In 2012 zijn de rassen onderzocht op vier locaties in Nederland voor opname op de Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouwgewassen. Van de vier locaties lagen er drie op kleigrond en één op zandgrond. Op alle locaties is zowel een proef zonder ziektebestrijding als een proef met ziektebestrijding uitgevoerd. De proeven lagen voor een deel bij PPO-proefbedrijven en voor een deel bij kweekbedrijven.

Overzicht eigenschappen* (gem. 2005 t/m 2012) en korrelopbrengsten (gem. 2011 en 2012) van zomertarwerassen

		<u>resistentie tegen</u>								<u>opbrengst klei (rel.)</u>		<u>opbrengst zand (rel.)</u>	
	rubricering**	lengte stro (rel.)	stevigheid	vroegeheid aar	vroegrijpheid	bladvlekkenziekte	meeldauw	bruine roest	schot	met ziektebestr.	zonder ziektebestr.	met ziektebestr.	zonder ziektebestr.
Rassenlijststrassen													
Tybalt	A	96	7	6.5	7	6	8.5	6	8	100	104	104	101
Trappe	A	104	7.5	6.5	6	7.5	6.5	8	8	100	96	96	99
2 jaar onderzocht													
Quintus		101	6	7	7	7.5	7.5	7.5	5	107	110	110	112
100 = ... cm; ton/ha		93								8.8	7.7	8.1	7.8

* een hoger cijfer duidt op een gunstige waardering voor de betreffende eigenschap (goede stevigheid van het stro, vroeg in aar komen, vroeg rijp en goede resistenties)

** rubricering op de Aanbevelende Rassenlijst 2013 (A= Algemeen aanbevolen ras)

Bron: PPO (onderzoek uitgevoerd in opdracht van Plantum NL en Productschap Akkerbouw).